

Arbetsbeskrivning sjukstugan

För omhändertagande av patient med misstanke om smittsam sjukdom.

INGEN RISK	LÅG RISK	HÖG RISK
<p>INGEN anamnes På Feber Hosta Tungandad Övre luftvägssymtom (Ont i halsen, snuva)</p> <p>Samt ingen känd exponering</p>	<p>Anamnes: på endast ETT av följande symtom Feber Hosta Tungandad Övre luftvägssymtom (Ont i halsen, snuva)</p> <p>Samt ingen känd exponering</p>	<p>Anamnes på 2-4 av följande symtom: Feber Hosta Tungandad Övre luftvägssymtom (Ont i halsen, snuva) ELLER Ett eller flera av ovanstående symtom OCH känd exponering för COVID 19 senaste 14 dagarna.</p>
<p>Ex screening provtagning utan symtom, oro</p> <p>BASALA HYGIENRUTINER</p> <p>Handläggning nere i infektionsrum eller ute.</p>	<p>Skyddsutrustning personal: Basala hygienrutiner inklusive:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Handskar - Vanligt plastförkläde <p>Gäller även vid blodprovstagning Vid inhalation -IIR munskydd</p> <p>Vid NPH prov och risk för kroppsvätskor : IIR + visir+ långärmat skyddsförkläde</p>	<p>Skyddsutrustning personal: Basala hygienrutiner inklusive:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Visir - Munskydd IIR/FFP2 <p>(FFP3 vid risk för aerosolbildning)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Långärmat skyddsförkläde - Handskar <p>Gäller även vid blodprovstagning eller inhalation</p>

I Receptionen – Anamnes oavsett vad patienterna söker för **SKA Riskbedömning** göras!

Handläggning på sjukstugan

Säkerhetsavstånd: Alla patienter kan vi ta anamnes utan skyddsutrustning på ett säkerhetsavstånd av 2 meter. Vid behov av närmare undersökning måste bedömning göras om patienten ska handläggas enligt låg eller hög risk.

INGEN RISK

Handläggning av patient efter den åkomma de söker för

LÅG risk

Patienter med LÅG risk som har behov av sjukhusvård -via infektionsrum för bedömning (Personal:skyddsklädsel efter beskrivning)

HÖG risk

Informera patient om hosthygien -hosta i papper/näsduk. Patienter som efter triage EJ bedöms vara i behov av sjukhusvård men betraktas som HÖG risk. Lämna information -*undvik att träffa andra förutom de som finns i samma hushåll.* (Personal:skyddsklädsel efter beskrivning)


Behov av utrustning – när man är inne på sal med covid-19

– komradio upp till ssk exp.

Den som svarar på ringning håll säkerhetsavstånd! – behov av att gå nära för att lämna över utrustning ta på IIR munskydd !

Efter initial bedömning/ anamnes: tar akutläkaren ställning om Covid-19 -misstanke vidare handläggning i samråd med medicinbakjour/ infektionsjour

Om övervägande IVA-vård: sker i samråd Medicinbakjour, IVA-jour & Infektionsjour



Prov för COVID-19

Inläggning av patienter med infektionssymtom. SKA provtas – *följ provtagningsanvisningar – skyddsutrustning.*

Efter konsultation med läkare så tas beslut om provtagning -riskgrupp.

Riskgrupp för allvarlig utgång av covid-19 är: ålder >70 år och/eller hjärt-kärlsjukdom, diabetes, njursvikt, kronisk lungsjukdom.

När ska man ta prov trots att misstanken om covid-19 är låg?

Folkhälsomyndigheten uppmanar till att vara frikostig med att ta prov för covid-19 för att hitta oföretsdda fall bland patienter. Vid sådan provtagning betraktas inte den person som testas som smittad och handläggs därför utan särskilda rutiner för covid-19. Patienten behöver alltså inte isoleras för att man provtar. Provtagningen sker med normala basala hygienrutiner.

Hantering av material

Visir får återanvändas - spritas av efter varje användning.

Icke återanvändbart material ska sättas i påse->förslutas på rummet om det ej är nedsmutsat av kroppsvätskor = vanlig sophantering. Gul riskavfallsbehållare om det är nedsmutsat. Tvätt som ej är nedsmutsad av kroppsvätskor ->vanlig tvättsäck . Nedsmutsad tvätt av misstänkt covid19 SKA läggas i vattenlöslig säck inne på rummet(läs rutin av vårdhygien).

Transport av patient

Informera patient om hosthygien -hosta i papper/näsduk. Personal ska bära munskydd och handskar -välj närmast transportväg. Munskydd IIR på patient.

Städrutin efter handläggning av misstänkt covid-19 på mottagning

på mottagning räcker enklare städning. Detta gäller även provtagning som kan arrangeras som snabb provtagning i ett utrymme som är avskilt från andra vårdlokaler.

- torka av alla patientnära ytor med ytdesinfektionsmedel med tensid.
- Punktdesinfektion ska alltid utföras vid spill på ytor inklusive golv.

KOM IHÅG

- Skriv upp personal som handlagt patient - lista i covid19 pärm